

SOMMERDURUM

COLLIODUR

BESTE NUDELN ZUM WEIN



QUALITÄT



TOP
SORTIERUNG



TROCKEN
TOLERANT

- ☿ Sichere Ertragsleistung
- ☿ Früher – mittelfrüher Typ mit guter Sortierung > 2,8 mm
- ☿ Breite Grundresistenz

- ☿ Hohe TKM und beste hl-Gewichte
- ☿ Gute Kochfarbe, hohe Gelbpigmentgehalte
- ☿ Breite Anbaueignung

Sorteneigenschaften Hartweizen*

Ährenschieben	4	früh - mittel
Reife	5	mittel
Pflanzenlänge	6	mittel-lang
Neigung zu Lager	6	mittel - hoch

Qualität Hartweizen*

Sortierung >2,8mm	7	hoch
Hektolitergewicht	6	mittel - hoch
Fallzahl	5	mittel
Rohproteingehalt	5	mittel
Mineralstoffwertzahl	7	hoch
Glasigkeit	7	hoch
Neigung zu Dunkelfleckigkeit	7	hoch
Gelbpigmentgehalt	7	hoch
Farbton	8	stark - sehr stark
Kochpotential	7	hoch

* bsp.

Ertrag Hartweizen*

Bestandesdichte	6	mittel-hoch
Kornzahl/Ähre	5	mittel
Tausendkornmasse	6	mittel - hoch
Kornertrag Stufe 1	8	hoch - sehr hoch
Kornertrag Stufe 2	6	mittel - hoch

Krankheitsanfälligkeit*

Mehltau	3	gering
Blattseptoria	4	gering - mittel
Gelbrost	4	gering - mittel
Braunrost	5	mittel

* Einstufung nach BSL 2023

COLLIODUR

Bestandesführung

Aussaattermin:

möglich

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai

optimal

Aussaat:

Je nach Saatzeit/Bestellbedingungen

- ☞ früh/gut: 350 – 380 K/m²
- ☞ mittel: 380 – 420 K/m²
- ☞ spät/schlecht: 420 – 450 K/m²

Wichtig: frühzeitige, trockene Aussaat sichert Ertrag und Qualität ab

Düngung:

Abhängig von Ertragserwartung und N-Nachlieferung in mehreren Gaben (wie Qualitätsweizen)

- ☞ Zur Saat: 70 – 80 kg N/ha
- ☞ EC 29/32: 30 – 50 kg N/ha
- ☞ EC 49/51: 60 – 80 kg N/ha

Auf die Einhaltung der Düngeverordnung ist zu achten!

Fungizide:

- ☞ Gezielte Maßnahmen je nach Befallslage sind zu empfehlen
- ☞ Ährenbehandlung zur Absicherung der hohen Qualität

Wachstumsregler-Einsatz:

Im intensiven Anbau sind mittlere bis höhere Mengen zu empfehlen.

Beispiel:

- ☞ BBCH 31 – 39 0,5 – 0,6 | Moddus
oder
- ☞ BBCH 31 – 39 0,6 – 0,8 | Medax Top

